

Régulateur de croissance pour que soit sous contrôle la pousse des gazons sportifs et d'ornement

- Pas de résidus dans le sol, rapidement dégradé par la lumière
- Sans odeur, formulation liquide facile à doser
- Utilisation sur tous les types de surfaces engazonnées

Teneur 11,3 % trinéxapac-éthyl (116 g/l)

Formulation Concentré soluble dans l'eau (SL)

Efficacité Primo Maxx réduit la fréquence des tontes fortement et la quantité de résidus de tonte tout en régulant la croissance du gazon. La pleine régulation de la croissance avec Primo Maxx débute 3 à 5 jours après l'application. Primo Maxx atteint le point de végétation après avoir été rapidement absorbé par le feuillage. Pour que Primo Maxx montre une pleine efficacité, l'application doit être terminée au moins trois heures avant une irrigation ou une averse. Les zones traitées avec Primo Maxx peuvent continuer d'être entretenues normalement quant à l'irrigation, la fertilisation, la lutte contre les mauvaises herbes et des maladies ou ravageurs.

Les conditions environnementales ainsi que les méthodes agronomiques et d'exploitation qui affectent la croissance et la vigueur du gazon influenceront la réponse du gazon aux applications de Primo Maxx. Il a été démontré que l'activité de Primo Maxx est influencée par le niveau de fertilité et d'humidité, la vigueur et la longueur du gazon ou encore la fréquence de la tonte.

Comme les passages de fauche peuvent être réduits jusqu'à 50 % lorsque le Primo Maxx est utilisée correctement, il y a moins de matière à couper. On donne aux plantes une couleur verte et on favorise la croissance végétative. Primo Maxx empêche la floraison de *Poa annua* et *Poa trivialis* et inhibe leur développement. Lorsqu'il est utilisé sur un terrain de sport, le Primo Maxx fait mieux rouler les balles et les marquages deviennent plus visibles.

Emploi

Gazon d'ornement et terrains de sport

Le dosage en générale: 0,4 à 2,4 l/ha. Le dosage est à déterminer en fonction du type de gazon, de l'espèce majoritaire et de l'effet escompté (inhibition plus ou moins fortement de la croissance des graminées).

Terrain de golf: green 0,4–0,8 l/ha, fairway coupe < 18 mm, 0,8 à 1,6 l/ha. Lors d'une forte présence de Ray-grass jusqu'à max. 2,4 l/ha.

Gazons de sport et d'ornement: Conseil générale: 1,5 l/ha (15 ml dans 10 l d'eau par 100 m²).

Fétuque, pâturin 2,4 l/ha. En cas de forte présence de *Poa annua*, veuille réduire le dosage de moitié ainsi que les intervalles de traitements. Pour les gazons d'ornement composés uniquement de fétuque rouge, il ne faut pas dépasser la dose de 1,6 l/ha.

Primo Maxx[®]

Emploi 2

Application: Appliquer de préférence après la tonte mais au plus tôt 1 h après la coupe. Pour s'assurer que Primo Maxx est pleinement efficace, il doit être appliqué au moins 3 heures avant la prochaine irrigation. Répéter l'application à intervalle de 4 semaines. Appliquer Primo Maxx lorsque le gazon pousse activement. Ne pas appliquer Primo Maxx, si le gazon est dormant, sous stress, 2 semaines avant ou après les pratiques de cultures intensives comme une scarification. Deux semaines avant ou après un traitement intensif du gazon (p. ex., scarification), ne pas effectuer de traitement. Si les traitements sont répétés à de plus petits intervalles (env. 2 semaines), la dose d'application peut être réduite.

À observer

- Primo Maxx peut provoquer un jaunissement temporaire. Cela se produit généralement 1 semaine après le traitement initial. Pour limiter le plus possible ce jaunissement, appliquer de suite un engrais azoté.
- Aucuns traitements pendant une très forte sécheresse.
- Appliquer au max. 16 l/ha et par an de Primo Maxx. 300 à 1'000 l de bouillie par ha.
- L'utilisation régulière de Primo Maxx permet de concurrencer l'installation et le développement de Poa annua.
- Aucune pluie pendant au moins 1 heure après le traitement.
- Ne pas traiter durant les périodes avec risques de gel.
- Eviter le chevauchement lors de l'application
- En l'absence de traitements répétés, le gazon traité avec Primo Maxx pourrait pousser plus rapidement que le gazon non traité pendant plusieurs semaines après une période où la croissance a été inhibée.

Protection d'utilisateur: Préparation de la bouillie: Porter des gants de protection.

Protection de la jeunesse: Les jeunes en formation professionnelle initiale ne peuvent travailler avec ce produit (cette substance/cette préparation) que si cela est prévu dans l'ordonnance de formation professionnelle pour atteindre les buts de formation et que si les conditions du plan de formation et les limites d'âge applicables soient respectées. Les jeunes qui ne suivent pas de formation professionnelle initiale ne peuvent pas travailler avec ce produit (cette substance/cette préparation). Sont réputés jeunes gens les travailleurs des deux sexes âgés de moins de 18 ans.

Propriétés

Observer la mise en garde de l'emballage.

Environnement: Primo Maxx épargne les auxiliaires. Primo Maxx n'est pas persistant et sa demi-vie en conditions extérieures est courte. Primo Maxx n'est pas volatil et ne se lessive pas. Il présente un faible risque écologique pour la biosphère.

Emballages

1 l, 12x 1 l

Marque

[®] = Marque enregistrée d'une société du groupe Syngenta

Version

62764/0220